

Lịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ em tại Việt Nam

tháng 3 năm 2015

Vắc-xin	Lịch tiêm (tháng tính từ ngày sinh)
Vắc xin BCG <i>Phòng bệnh lao</i>	Càng sớm càng tốt ngay sau khi sinh
Vắc xin viêm gan B liều sơ sinh <i>Phòng bệnh viêm gan B</i>	Càng sớm càng tốt ngay sau khi sinh (trong vòng 24 giờ)
Vắc xin Quinvaxem <i>Phòng bệnh Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván- Viêm gan B- và viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn Hib.</i>	Mũi tiêm thứ 1: khi trẻ 2 tháng tuổi Mũi tiêm thứ 2: khi trẻ 3 tháng tuổi Mũi tiêm thứ 3: khi trẻ 4 tháng tuổi
Vắc xin bại liệt (OPV)* <i>Phòng bệnh bại liệt</i>	Uống liều thứ 1: khi trẻ 2 tháng tuổi Uống liều thứ 2: khi trẻ 3 tháng tuổi Uống liều thứ 3: khi trẻ 4 tháng tuổi
Vắc xin sởi <i>Phòng bệnh sởi</i>	Mũi tiêm thứ 1: khi trẻ 9 tháng Mũi tiêm thứ 2: khi trẻ 18 tháng**
Vắc xin tiêm nhắc bạch hầu, uốn ván và ho gà (DPT) <i>Phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà</i>	Khi trẻ 18 tháng
Vắc xin viêm não nhật bản <i>Phòng bệnh Viêm não Nhật Bản</i>	Tiêm 2 mũi khi trẻ 1 tuổi. Mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 2 tuần. Tiêm mũi thứ ba sau mũi thứ hai 1 năm.
Vắc xin Tả <i>Phòng bệnh tả</i>	Cho trẻ uống 2 liều khi trẻ từ 2 đến 5 tuổi (tại các vùng có nguy cơ dịch)
Vắc xin thương hàn <i>Phòng bệnh Thương hàn</i>	Cho trẻ 3-10 tuổi (ở các vùng có nguy cơ dịch)
Vắc xin uốn ván <i>Phòng bệnh uốn ván</i>	Tiêm ít nhất 2 mũi cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-45 tuổi) để bảo vệ trẻ ngay từ khi sinh ra.

*Cuối năm 2015/đầu năm 2016: một liều vắc xin bại liệt bất hoạt sẽ được sử dụng cho trẻ 4 tháng tuổi.

**Cuối năm 2015, vắc xin phối hợp sởi-rubella sẽ được tiêm thay thế vắc xin sởi đơn khi trẻ 18 tháng.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Ms. Tran Thi Loan

Tel: +84 43 943 3734-6 (ext. 83886) | Email: media.vtn@wpro.who.int | <http://www.wpro.who.int/vietnam>